

Abbey Pain Scale - SWE

För bedömning av tecken på smärta hos personer med kognitiv sjukdom som inte kan uttrycka smärta i tal.

Observera personen och gör en bedömning med hjälp av frågorna.

Namn:					Personnummer:									
Datum:														
Klockslag:														
Ljuduttryck till exempel gnyr, jämrar sig, gråter					Inte alls=0 Lite=1 Måttligt=2 Mycket=3									
Ansiktsuttryck till exempel ser spänd ut, rynkad panna/ihopdragna ögonbryn, grimaserar, ser rädd ut					Inte alls=0 Lite=1 Måttligt=2 Mycket=3									
Förändrat kroppsspråk till exempel rastlös, vaggar, skyddar en kroppsdel					Inte alls=0 Lite=1 Måttligt=2 Mycket=3									
Förändrat beteende till exempel ökad förvirring, vill inte äta, förändring i det vanliga beteendemönstret, tillbakadragen					Inte alls=0 Lite=1 Måttligt=2 Mycket=3									
Fysiologisk förändring till exempel förändrad kroppstemperatur, puls/BT, svettningar, rodnad, blekhet					Inte alls=0 Lite=1 Måttligt=2 Mycket=3									
Kroppslig förändring till exempel hudskador, tryckskador, artrit, kontrakturer					Inte alls=0 Lite=1 Måttligt=2 Mycket=3									
Summa:														
Signatur:														

Typ av smärta: Långvarig Akut

Ingen=0 – 2 Mild=3 – 7 Måttlig=8 – 13 Svår=14+

Framtagen av universitetslektor Christina Karlsson, Örebro universitet

Originalskala: Abbey J, Piller N, De Bellis et al (2004) The Abbey pain scale: a 1-minute numerical indicator for people with end-stage dementia. Int J Palliat Nurs 10(1): 6–13