

Influensavaccinering – kommunal hälso- och sjukvård

Se Region Örebro läns samlingssida med information om [Influensavaccin](#).

Förberedelser

1. Läkare och sjuksköterska planerar genomförandet i god tid innan influensavaccinering ska påbörjas.
2. Sjuksköterska informerar och tillfrågar aktuella patienter/anhöriga om vaccinering.
3. Sjuksköterska samlar in uppgifter inför ordination av influensavaccin.
4. Använd blankett [Vaccination, underlag för journalföring](#).

Ordination

5. Läkare och sjuksköterska med behörighet att förskriva läkemedel ska skriva in ordinerat vaccin på blanketten – Vaccination, underlag för journalföring.
6. Ordinator ska förvissa sig om att inga kontraindikationer finns för att ordinera och ge vaccinet.

Vaccinering

7. Blanketten Vaccination, underlag för journalföring används som underlag vid vaccineringen.
8. Vaccinator (den som ger vaccinet) ska förvissa sig om att inga kontraindikationer finns för att ge vaccinet och ska inte vaccinera om patienten har feber eller tidigare har reagerat mot vaccin.
9. Angående Waranbehandling/Noak se Regionens sida Influensavaccin och Vaccination av personer med ökad blödningsbenägenhet och injektionsteknik.
10. Patienten ska hållas under uppsikt i 10 minuter efter vaccineringen.

Beredskap

11. Läkemedel för att kunna hantera en anafylaktisk reaktion, se nedan.
12. Vaccinator ska ha kunskap om symtom och behandling vid en anafylaktisk reaktion.

Dokumentation

- Ordination ska av ordinator dokumenteras i respektive journal och på blanketten Vaccination, underlag för journalföring.
- Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård som ger vaccin ska dokumentera enligt följande:
 - Vaccin:
 - Ordinator:
 - Vaccinator:
 - Givet i v/h arm:
 - Batchnummer:
 - Givet datum och klockslag
- Blanketten Vaccination, underlag för journalföring ska sparas i journalen och kopia lämnas till vårdcentralen.

Influensavaccin - förstärkt eller standard - 2022

Förstärkt influensavaccin gäller för 65 år och äldre på SÄBO och hemsjukvård.
Standard influensavaccin – 64 år och yngre.

Vem	Förstärkt influensavaccin FluAd – Fluad Tetra	Standardvaccin influensa Vaxigrip Tetra
64 år och yngre	Nej	Ja
65 år och äldre på Säbo /i hemsjukvård	Ja	Nej

Kombinera vaccin – samtidigt eller inte

- **Både standardvaccin och förstärkt vaccin mot influensa kan ges ihop med vaccin mot covid-19.**
- Covidvaccin + influensavaccin ges antingen samtidigt (olika extremiteter) **eller med minst sju dagars mellanrum.**
- Vaccin mot Covid-19 kan ges samtidigt som de flesta andra vacciner. Max antal vacciner bör vara två per gång. Av logistiska skäl kan fler vacciner ges efter individuell bedömning. Beakta risken för additiva effekter av biverkningar.
- Standardvaccin mot influensa, Vaxigrip Tetra, kan ges samtidigt med vaccination mot pneumokocksjukdom.
- Förstärkt vaccin mot influensa, FluAd, kan ges samtidigt med vaccination mot pneumokocker.
- Flera vaccin med adjuvans (exv FluAd + Nuvaxovid) bör ej ges samtidigt.
- [Pneumokockvaccin](#) – egen blankett.

Allvarlig allergisk reaktion/ Anafylaxi

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera en anafylaktisk reaktion.

- Två st. injektionspennor Emerade (alt. Jext) ska alltid finnas med vid vaccinationstillfällena.
- Vid en eventuell allvarlig allergisk/ anafylaktisk reaktion ska inj. Emerade ges enligt instruktion.
- Larma alltid ambulans direkt!
- Efter inj. av Emerade ge dessutom 2 st. tabl. Ceterizin 10 mg (=20mg)
- Samt 10 st. tabl. Betapred 0,5 mg.
- En andra dos Emerade kan behöva ges efter 5–10 minuter om symtomen inte förbättras, om symtomen förvärras eller återvänder.

Läkemedel som får ges enligt generellt direktiv av sjuksköterska i kommun i överenskommelse med primärvård Örebro län 2022-02-16.

Indikation	Läkemedel	Dosering och maxdos	Anmärkning/ Kontraindikation
Anafylaxi	Emerade injektionspenna		Vid anafylaktisk reaktion Ring samtidigt 112
	300 mikrogram 500 mikrogram	≤ 50 kg 1 inj im > 50 kg 1 inj im	Upprepa efter 5-10 min vid dålig effekt
	Vid brist på Emerade: Jext injektionspenna		Vid anafylaktisk reaktion Ring samtidigt 112
	300 mikrogram 300 mikrogram	≤ 50 kg 1 inj im > 50 kg 2 pennor å 300 mikrogram im	Upprepa efter 5-10 min vid dålig effekt
	Cetirizin tablett 10 mg	2 tabletter	2 tabl å 10 mg (=20 mg) ges vid anafylaktisk reaktion
	Betapred tablett 0,5 mg	10 tabletter (tuggas, sväljes hela eller löses i vatten)	10 tabl å 0,5 mg (=5 mg) ges vid anafylaktisk reaktion